

## ALLEGATO D)

### PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLO *SCAPHOIDEUS TITANUS* IN TOSCANA

Le seguenti procedure, definite dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana, devono essere adottate per il monitoraggio di *Scaphoideus titanus* nelle “zone focolaio”, così come individuate al punto 2 del presente decreto, nei territori dei comuni, di cui all’ allegato A, in cui è stata segnalata la presenza dell’insetto, e in tutti gli altri vigneti in cui si ritiene necessario verificarne l’eventuale presenza al fine di ampliare la rete di monitoraggio regionale.

Il monitoraggio dello *Scaphoideus titanus* deve essere effettuato in ogni vigneto aziendale, inteso come superficie vitata priva di discontinuità, mediante l’esposizione di trappole cromotropiche intese come fogli di plastica di colore giallo, con colla, di circa 25 x 30 cm da posizionare all’altezza della vegetazione prevalente: a) nei vigneti allevati a spalliera poco sopra i grappoli, circa tra il primo e il secondo filo; b) nei campi di piante madri portainnesto nella zona dei sarmenti; c) nei barbatellai all’altezza del punto di innesto.

In ogni vigneto vanno collocate almeno 2 trappole, distanti minimo 50 m l’una dall’altra, preferibilmente nelle zone più ombreggiate e più fresche del vigneto in prossimità di borri, fossi e/o alberature. In superfici vitate molto ampie e contigue devono essere collocate almeno 2 trappole ogni tre ettari. I filari in cui vengono messe le trappole sarebbe opportuno contrassegnarli in testata con un segnale ben visibile, anche da lontano, e non confondibile, in modo da poter individuare facilmente, al momento del recupero, il punto in cui sono state collocate.

Il periodo di esposizione è quello di più probabile presenza degli adulti, cioè circa dall’inizio della terza decade di luglio fino alla fine di agosto (tenere conto delle indicazioni fornite dal bollettino redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale sul suo sito internet). Le trappole devono essere sostituite ogni 15-20 giorni in quanto perdono la capacità collante. Sono raccomandati 2 turni di esposizione.

Togliere le trappole dal campo quando la vegetazione è asciutta quindi non dopo eventuali piogge. Al ritiro dal campo le trappole devono essere avvolte e tenute separate con pellicola trasparente ben distesa su entrambi i lati, in modo da consentire un facile riconoscimento degli insetti catturati. Per essere conservate le trappole vanno tenute in luogo fresco, ma asciutto. Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare il deterioramento degli esemplari catturati rendendoli irriconoscibili;

In un angolo della trappola sulla pellicola che l’avvolge e la separa dalle altre deve essere collocata un’etichetta con indicato il nome del comune, dell’azienda, del vigneto dove è stata collocata la trappola e il periodo di esposizione inteso come data di inizio e termine. **Le trappole al termine periodo di esposizione e dopo essere state ritirate dal vigneto devono essere controllate da un tecnico esperto oppure consegnate o spedite al Servizio Fitosanitario Regione Toscana (Via A. Manzoni n.16, 50121 Villa Poggi, FIRENZE) per il riconoscimento di eventuali adulti di *Scaphoideus titanus* insieme alla scheda di monitoraggio compilata (allegato E del decreto).**

**IMPORTANTE:** Ad ogni vigneto monitorato deve corrispondere una scheda di monitoraggio (allegato E del decreto) che deve accompagnare sempre le trappole utilizzate nel monitoraggio di quel vigneto; tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata al termine del monitoraggio, per posta (Via A. Manzoni n.16, 50121 Villa Poggi, FIRENZE) o via fax (055-4383990), o via e-mail ([piero.braccini@regione.toscana.it](mailto:piero.braccini@regione.toscana.it)) al Servizio Fitosanitario Regione Toscana.

**Nel caso che le trappole vengano controllate da un tecnico esperto e venga rilevata la presenza anche di un solo esemplare di *Scaphoideus titanus*, l'azienda agricola utilizzando la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte dovrà comunicarlo entro e non oltre il 15 di settembre 2018 al Servizio Fitosanitario Regionale per posta (Via A. Manzoni n.16, 50121 Villa Poggi, FIRENZE) o per fax(055-4383990) o via e-mail ([piero.braccini@regione.toscana.it](mailto:piero.braccini@regione.toscana.it)).**

**Nel caso che le trappole vengano controllate da un tecnico esperto e NON venga rilevata la presenza di *Scaphoideus titanus*, l'azienda agricola deve comunque inoltrare al Servizio Fitosanitario Regionale la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte.**

**Una copia della scheda di monitoraggio compilata e aggiornata in ogni sua parte deve comunque essere presente in azienda dall'inizio dell'attività di monitoraggio.**

**In ogni caso le trappole dovranno essere conservate integre, insieme alla schede di monitoraggio, a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale fino al 31 Maggio dell'anno successivo a quello del monitoraggio.**

**RECAPITI SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA**

**Via A. Manzoni n. 16 – 50121 Villa Poggi – FIRENZE**

**Fax 055-4383990**

**E-mail : [piero.braccini@regione.toscana.it](mailto:piero.braccini@regione.toscana.it)**

**Sito : <http://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale>**